



**NOVA-Praxis-Hygiene®**

AURUS d.o.o.  
Puconci 251  
SI-9201 Puconci  
E: info@aurus.si  
T/F:02/57-35-144  
M: 041-680-141  
[www.aurus.si](http://www.aurus.si)



# Novaderm

Ne vsebuje negovalnih učinkovin

## Tip izdelka

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za vtiranje v kožo in roke. Novaderm ne vsebuje dolgo delujočih sestavin ali drugih dodatkov in je zelo prijazen do kože. Novaderm je certificiran pri **DGHM** (Nemška družba za higieno in mikrobiologijo) in je na **VAH** listi.

## Indikacije

Dezinfekcija kože pred injekcijami, operacijami, za higieno razkuževanje rok in za hladilne obkladke.

## Doziranje in uporaba

Če ni drugače predpisano, vtrite v kožo in pustite, da se osuši. Za higieno razkuževanje rok uporabite 3 – 5 ml Novaderma, ga vtrite v kožo in pustite, da se osuši. Za hladilne obkladke uporabite Novaderm, ki ga razredčite z isto količino vode ter uporabite.

## Higieno in kirurško razkuževanje rok

Novaderm nanesite na suhe roke in vtirajte 30 sekund, skladu s protokolom za higieno razkuževanje rok. Pri kirurškem razkuževanju Novaderm vtirajte v kožo 3 minute, v skladu s protokolom za kirurško razkuževanje rok.

## Razkuževanje kože pred posegi, kot priporočila DGHM

- pred punkcijami, injekcijami je predhodno potrebno kožo 15 sekund razkuževati z razkužilom Novaderm,
- pred operacijami, kjer je koža tanka, kožo razkužujete 1 minuto z razkužilom Novaderm,
- kjer so v koži bolj pogosto posejane žleze lojnice in znojnice, je pred operacijami potrebno kožo 10 minut razkuževati z razkužilom Novaderm.

## Mikrobiološke lastnosti

Novaderm deluje baktericidno (vklj. TBC, MRSA), fungicidno, virucidno (HBV/HIV, BVDV, HCV, Rota-herpes virusi).

**Sestava** 100 g raztopine vsebuje: 2-propanol 70 %(V/V) 62,8 g, prečiščena voda in dodatki 37,2 g

## Pakiranje

5 000 ml kanister

**pripomočki:** 500 / 1 000 ml plastenka,  
pumpica za plastenko, stenski dozirnik,  
pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

## Opozorilo

Novaderm ni primeren za shranjevanje sterilnih inštrumentov in brizg.

## Neželeni in stranski učinki

Novaderm ni primeren za razkuževanje odprtih ran in sluznice. Pri vtiranju Novaderma v kožo se lahko pojavi iritacija kože ali pekoč občutek.

## Posebna opozorila

Lahko vnetljivo. Hraniti v zaprti originalni embalaži pri temperaturi do 24°C in proč od vira toplote. V primeru razlitja pobrisati razlito tekočino in jo razredčiti z vodo. Prostor temeljito prezračiti in odstraniti izvore vžiga. **Shraniti izven dosega otrok.**